

# BELEEGYZŐ NYILATKOZAT

Röntgen vezérelt stereotaxiás biopszia (mintavétel) ill. műtét előtti dróthurkos jelölés elvégzéséhez

Beteg neve: @@paciens\_neve

Anyja neve: @@anya\_neve

Született: @@szüldátum

Lakcím, telefon: @@áll\_irányítószám @@áll\_település @@áll\_utca\_házzszám

TAJ szám: @@taj\_maskszam

**1. Az eljárás célja:** a kórosnak gondolt elváltozásból sejtteni vagy szövettani feldolgozásra mintát veszünk a pontosabb diagnózis felállítása végett, vagy folyadék gyülemeket bocsátunk le gyógyítás céljából, vagy gyógyszerek bejuttatását végezzük (ismert elváltozás esetén) gyógyítási céllal.

A stereotaxiás röntgen vezérlés lehetővé teszi a mintavétel illetve a beavatkozás helyének pontos meghatározását. A mintavételt követően körülbelül 20 perces megfigyelés után a beteg hazamehet.

**2. Az eljárás technikája:** a beavatkozás kisműtői sterilitás körülményei között végezzük. Fertőtlenítjük a bőrt, majd ezt követően történik egy vékony tűvel a sejt mintavétel vagy folyadék leszívás.

Szövettani mintavétel esetén a speciális eszközzel való beszúrással előtt helyi érzéstelenítést is végzünk.

A kapott sejt- vagy szövetszövetmintákat feldolgozásra küldjük.

A tűszúrás során - ha szükséges és lehetséges - a kóros elváltozásba gyógyszerek bejuttatása is megtörténhet.

Minden esetben a beavatkozás röntgen kontroll alatt történik.

**3. Az eljárás esetleges veszélyei és ezzel kapcsolatos eddigi tapasztalatok:** a beavatkozás a vérvételhez hasonlóan, egy *tűszúrásnyi fájdalommal jár*. A beszúrással ritkán kis vérömleny keletkezhet, mely szövődmény mentesen felszívódhat. Mellkasi és felső hasi szúrás esetén a tüdő sérülés következtében szövődményként levegő kerülhet a mellüregbe (ptx). Ennek kisebb mennyisége spontán felszívódik, nagyobb mennyiség esetén szükséges beavatkozni. Az esetleges szövődmények kimutatása végett a beavatkozást követően szükséges egy áttekintő mellkas rtg felvétel.

**4. Ezen eljárás elmaradásának esetleges veszélyei és más eljárási lehetőségek:** ez az eljárás más egyszerű, veszélytelen, műtėti beavatkozást nem igénylő módszerekkel nem helyettesíthető. A műtét nélküli sejt és szövettani mintavétel *segíti a pontos diagnózis felállítását*. A folyadékgyülemek (cysták) lebocsátása vagy a helyi gyógyszeres kezelés csaknem minden esetben gyógyítási céllal történik, *így elkerülhetővé válhat a műtėti beavatkozás*.

Tud-e lidocain érzékenységről?

igen

nem

Tud-e vérzékenységről?

igen

nem

Szed-e vérhígító gyógyszert?

igen

nem

**5.** Tudomásul veszem, hogy kockázatot jelenthet a kivizsgálás során ez idáig fel nem derített betegségek fennállása.

A fenti felvilágosítás alapján és a kérdéseimre kapott válaszok birtokában döntöttem és **hozzájárok** a beavatkozás elvégzéséhez.

Salgótarján, 2016. ....

.....  
beteg, vagy törvényes képviselő

.....  
vizsgálatot végző orvos

A fenti felvilágosítás alapján és a kérdéseimre kapott válaszok birtokában döntöttem és **nem járulok hozzá** a beavatkozás elvégzéséhez:

.....  
Beteg, vagy törvényes képviselő

.....  
vizsgálatot végző orvos